



# COMPO BARRERA DE ROEDORES



Producto: **COMPO BARRERA Cebo bloques para ratas y ratones**

## Ventajas del producto

**COMPO Barrera Cebo Bloques Ratas y Ratones** es un rodenticida listo para usar, altamente apetecible, basado en el potente anticoagulante Bromaliadona.

Es igualmente efectivo contra ratas y ratones, incluyendo razas resistentes a otros anticoagulantes.

La avanzada formulación, no dispersable, asegura que el producto es duradero y apropiado para uso en condiciones de humedad.

## Características Técnicas

**Tipo de Producto:** Antiplaga contra ratas y ratones.

**Composición:** Bromadiolona 0,0029%  
Excipientes 100%.  
Autorizado Uso Doméstico

**Tamaños de envase:** Estuche 300 gr.

## Aplicación

### Modo de empleo:

Lea y siga la información del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionado en el punto de venta antes de usarlo. Antes de usar productos rodenticidas, se recomienda la utilización de métodos no químicos (ej: trampas).

Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar.

Los portacebos deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras ... ). Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. No abrir lo bolsita que contiene el cebo – cuando sea relevante.

Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto.



## COMPO BARRERA DE ROEDORES

### Producto: COMPO BARRERA Cebo bloques para ratas y ratones

No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser

contaminadas por el mismo. No colocar los portacebos cerca de sistemas de drenaje de agua donde el cebo pueda entrar en contacto con el agua. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. Retirar el cebo sobrante y el portacebos al final del tratamiento.

#### Dosis cebos para ratas:

100 g de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínimo entre portacebos será de 5-10 m (5 m en el caso de una infestación muy fuerte y 10 m en una infestación débil).

#### Dosis cebos para ratones:

60 g de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar mas de un portacebo, lo distancia mínima entre portacebos será de 5-10 m (5 m en el caso de una infestación muy fuerte y 10 m en una infestación débil).

#### Tiempo necesario para observar el efecto en los roedores:

Debido al modo de acción retardado, los rodenticidas anticoagulantes pueden tardar entre 4 y 10 días en ser efectivos tras el consumo del cebo. Los roedores son transmisores de enfermedades. No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación. Este producto contiene un agente amargante y un colorante.

#### Observaciones:

Los portacebos deben revisarse al menos cada 2-3 días en caso de ratones y cada 5-7 días en caso de ratas al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez o la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario. Para el público en general se recomienda el uso de guantes.

#### **Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:**

Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina.

Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.



## COMPO BARRERA DE ROEDORES

**Producto: COMPO BARRERA Cebo bloques para ratas y ratones**

En caso de :

Exposición dermal, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.

- Exposición ocular, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.
- Exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA (Teléfono 91 562 04 20). Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.

### Forma de actuación:

La materia activa inhibe la coagulación de la sangre, con lo que las ratas después de su ingestión mueren sin dolor. El efecto se produce al 5º día de la ingestión evitando que las ratas lo asocien al cebo, manteniendo su consumo hasta la eliminación de la plaga. Gracias al efecto retardado del cebo las ratas suelen morir en el nido y raramente las verá fuera de éste.

### Período de utilización:

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.

Ideal	Posible	No Aconsejable