



ANTIPLAGAS



PRODUCTO: COMPO Antihormigas Pistola

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Para las plantas:

Es un insecticida líquido listo uso para el control de insectos rastreros en entornos domésticos que se encuentran tanto en el interior como en el exterior del hogar.

Para el usuario:

- Fórmula lista para usar.
- Envase pistola de fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Producto: Antiplaga contra hormigas, cucarachas, y pececitos de plata

Composición: Lambda-cihalotrina 0,05 %
Uso por el público en general

Tamaños de envase: Pistola de 750ml

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Evite cualquier contacto innecesario con el producto o la superficie tratada.

Una mala utilización puede causar daños a la salud. Aplique el producto únicamente cuando sea posible garantizar que no se contaminarán alimentos, bebidas y plantas comestibles, así como las áreas de cultivo de plantas comestibles.

Lávese las manos tras usar el producto. Mantenga el producto, su remanente, así como el recipiente vacío y el material de empaque alejados de las masas de agua. Evite la limpieza de las áreas tratadas para garantizar el efecto duradero del producto.

Informe al titular de la autorización si el tratamiento es ineficaz. Si la infestación persiste a pesar de haber seguido las instrucciones indicadas en la etiqueta, póngase en contacto con un profesional de control de plagas.



PRODUCTO: COMPO Antihormigas Pistola

Aplicación por pulverización:

Hormigas (uso exterior): Para acabar con los nidos de hormigas se pulveriza COMPO en los recorridos que hacen las hormigas y en las entradas de sus nidos, en las superficies enlosadas, como las terrazas. El mejor momento de aplicación es por las mañanas o al anochecer, cuando las hormigas están aún en sus nidos.

Hormigas (uso interior): Para acabar con los nidos de hormigas se pulveriza COMPO ANTIHORMIGAS en los recorridos que hacen las hormigas en las superficies interiores.

Lepismas (pececillos de plata), oniscídeos (cochinillas) y cucarachas (uso interior): La aplicación se realiza en puntos del área del terreno (tratamiento residual) en donde se haya observado el organismo objetivo.

Dosis y frecuencia de aplicación:

Hormigas (uso interior y exterior): 10 pulverizaciones en 1 metro de recorrido equivalen a 10 gramos de producto (44,5 g/m²). Aplicar una vez al mes como máximo, durante la temporada de actividad de las hormigas.

Lepismas (pececillos de plata), oniscídeos (cochinillas) y cucarachas: tratamiento residual (uso interior): Tratar las superficies desde una distancia aproximada de 30 cms. con el pulverizador manual aplicando de forma puntual entre 5 y 6 pulverizaciones (100 g/m²). Aplicar solo donde se supone que transitan los insectos.

Período de utilización:

| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| Ideal | Posible | No Aconsejable |
|-------|---------|----------------|
| | | |